



Compartint l'Anestesiologia a les Tres Nacions

Una Comarca, un Hospital, tres Idiomes...



HOSPITAL DE Cerdanya / HOSPITAL DE Cerdagne

Palau d'Esports i Congressos d'Alp, Girona

XIV

Congrés de la Societat Catalana
d'Anestesiologia, Reanimació i
Terapèutica del Dolor

8 i 9 de novembre de 2018

WWW.CONGRESSCARTD.ORG

CONTROL DEL DOLOR AMB SUFENTANIL SUBLINGUAL EN CIRURGIA "FAST-TRACK" D'ARTROPLÀSTIA TOTAL DE GENOLL

Roser Creixell*; Luís Muñoz*; Gerytza Chagas*, Alvys López*; Rosalina Moreno**; Eva Sánchez**;
Montserrat Sanclemente
Fundació Hospitalària Sant Joan de Déu de Martorell

L'implantació de guies fast-track en cirurgia d'artroplàstia total de genoll (PTG) és una pràctica habitual. La PTG produeix dolor agut postoperatori intens, motiu pel qual, hem buscat un tractament que permeti la recuperació precoç amb el mínim dolor.

OBJECTIUS

Analitzar l'eficàcia analgèsica del sufentanil sublingual enfront l'epidural en PTG. Comparar els temps de recuperació segons la tècnica utilitzada.

MATERIAL-MÈTODES

Estudi descriptiu transversal retrospectiu. Recol·lecció de dades dels pacients intervinguts de PTG durant 13 mesos. Les variables de temps estudiades van ser: prequirúrgic, d'intervenció, d'isquèmia, d'estada a reanimació, d'inici de rehabilitació, de sedestació i deambulació, i total d'ingrés.

Les variables de dolor van ser registrades amb l'Escala Visual Analògica (EVA) a l'alta de reanimació i a cada torn d'hospitalització.

RESULTATS

Pendent d'anàlisi definitiu. Es van recollir 173 pacients. En 74 es va utilitzar anestèsia intra-peridural, amb perfusió posterior de levobupivacaïna 0'125% i fentanil amb PCA durant 48h (Grup 1). En 88 es va realitzar anestèsia general o intradural amb bupivacaïna sense mòduls més infiltració intraarticular de levobupivacaïna 0'125%, utilitzant el dispositiu de sufentanil sublingual Zalviso® durant 72h per analgèsia postoperatoria (Grup 2). En 11 pacients es van realitzar altres tècniques per motius diversos.

Els valors mitjos d'EVA es van mantenir inferiors a 3 durant l'ingrés en ambdós grups, destacant que el 3r dia el grup 2 obté valors inferiors.

CONCLUSIONS

A l'espera dels resultats definitius, sembla que Zalviso® és una alternativa eficaç, que permet mantenir el dolor controlat, i també un inici de la rehabilitació precoç, obtenint una recuperació més ràpida.