



Compartint l'Anestesiologia a les Tres Nacions

Una Comarca, un Hospital, tres Idiomes...



Palau d'Esports i Congressos d'Alp, Girona

XIV Congrés de la Societat Catalana
d'Anestesiologia, Reanimació i
Terapèutica del Dolor

8 i 9 de novembre de 2018

WWW.CONGRESSCARTD.ORG

MANEJO ANESTÉSICO DE UN QUISTE DE LA BOLSA DE RATHKE EN PACIENTE GESTANTE CON CLÍNICA NEUROLÓGICA

Claudia Rodiera Clarens, Mireia Raynard Ortiz, Alejandra Ceballos Salazar, Rosa Borràs Ramírez, Yolanda Boliart San Felix, Alejandro Miranda Cirlot
Institut universitari Dexeus

Introducción:

Los quistes de la bolsa de Rathke son lesiones benignas poco frecuentes y predominantes en mujeres jóvenes. La mayoría son asintomáticos, pero en ocasiones crecen afectando el eje hipotálamo-hipofisario o producen compresión del quiasma óptico. Los cambios hormonales inherentes a la gestación producen un aumento del tamaño de la hipófisis causando un empeoramiento clínico, que incluso puede requerir finalizar la gestación.

Descripción del caso:

Paciente de 43 años, primípara de 34.5 semanas de gestación conseguida mediante FIV con antecedente de hipertiroidismo. Acude a urgencias por cefalea hemicraneal, diplopía binocular de aparición brusca a la mirada horizontal con afectación del VI par craneal, cuadrantanopsia bitemporal e hipertensión arterial iniciándose tratamiento hipotensor mas ingreso en UCI para monitorización y estudios complementarios con la sospecha inicial de preeclampsia. La RMN sin contraste inicial muestra una imagen compatible con un tumor hipofisario y el estudio de los potenciales evocados evidencian alteración de la conducción en ambas vías visuales. Dado el empeoramiento rápido y progresivo de la clínica neurológica se decide finalizar el embarazo mediante cesárea y anestesia epidural con Levobupivacaina logrando un bloqueo gradual y progresivo sin repercusiones hemodinámicas y el intraoperatorio transcurre sin incidencias. La clínica neurológica de la paciente disminuye hasta su completa desaparición a las 48h postcesárea.

Discusión:

La finalización del embarazo mediante cesárea de recurso debido a un quiste de la bolsa de Rathke, requiere un manejo anestésico adecuado con anestesia epidural.