



Compartint l'Anestesiologia a les Tres Nacions

Una Comarca, un Hospital, tres Idiomes...



Palau d'Esports i Congressos d'Alp, Girona

XIV Congrés de la Societat Catalana
d'Anestesiologia, Reanimació i
Terapèutica del Dolor

8 i 9 de novembre de 2018

WWW.CONGRESSCARTD.ORG

ANALGESIA REGIONAL COMBINADA EN EL LIPOFILLING EN RÉGIMEN AMBULATORIO. BLOQUEO SENSITIVO-MOTOR PROLONGADO

Anna Pascual, Jose Antonio Jiménez, Gema Maria Usua, Dolores Mateo
Hospital Vall d'Hebró

INTRODUCCIÓN

El "lipofilling" es una cirugía cada vez más empleada en régimen ambulatorio que se puede beneficiar de la combinación de distintos procedimientos anestésicos.

Estudios recientes destacan la incorporación de nuevas técnicas regionales ecoguiadas: bloqueos interfasciales abdominales (TAP) y pectorales (PEC I, PEC II y plano del serrato anterior), del nervio femorocutáneo y del nervio obturador.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Paciente mastectomizada que recibió radioterapia.

Se interviene de lipotransferencia a cuadrante superoexterno de mama de tejido adiposo del abdomen superior, flancos, muslo anterior y región trocantérea. Se efectúa bajo anestesia general combinada con bloqueos ecoguiados con ropivacaína 0,3%: PEC-II de mama (con 15ml de anestésico local), TAP bilateral (24ml en total) y femorocutáneo bilateral (10ml).

En el postoperatorio inmediato presenta EVA 0/10 y bloqueo sensitivo-motor completo de la extremidad superior derecha que demora el alta. A las 24 horas persiste EVA 0/10 y reversión total del bloqueo.

DISCUSIÓN

En este caso se combinan tres bloqueos, efectivos intra y postoperatoriamente. Por otra parte, destaca un bloqueo sensitivo-motor que podría explicarse por difusión del anestésico local hacia cefálico debido a la distorsión anatómica. Por este motivo, deberían valorarse potenciales complicaciones de cada bloqueo y la posibilidad de efectuar la intervención con anestesia local.

CONCLUSIÓN

La realización intraoperatoria de los bloqueos PEC II, TAP y femorocutáneo ecoguiados simultáneamente asociados a una anestesia general en el "lipofilling" de mama es una técnica efectiva que permite un adecuado control analgésico; no obstante, no está exenta de complicaciones.