



## Compartint l'Anestesiologia a les Tres Nacions

*Una Comarca, un Hospital, tres Idiomes...*



HOSPITAL DE CERDANYA / HOSPITAL DE Cerdagne

Palau d'Esports i Congressos d'Alp, Girona

# XIV

Congrés de la Societat Catalana  
d'Anestesiologia, Reanimació i  
Terapèutica del Dolor

8 i 9 de novembre de 2018

WWW.CONGRESSCARTD.ORG

# CONSIDERACIONS ANESTÈSIQUES EN CIRURGIA ROBÒTICA TRANSORAL: EXPERIÈNCIA INICIAL EN SAHS

Matarín S, Esclapez E, Galán P, Fuentes JF, De Nadal M, Rochera M  
Hospital Vall d'hebron

## Introducció

La cirurgia assistida per robot s'ha vist eficaç en el tractament del SAHS. L'objectiu és augmentar el diàmetre orofaríngi a expenses de reduir la base de la llengua. El maneig anestèsic implica un conflicte d'espai entre el camp de treball del cirurgià i de l'anestesiòleg.

## Sèrie de casos

Revisió de 6 casos clínics, basats en pacients d'entre 36 i 53 anys, intervinguts de SAHS.

Especial atenció a la predicció de VAD. En tots els casos es va realitzar anestèsia general. Intubació nasotraqueal n° 6.5-7 amb C-MAC, i el cirurgià sempre present.

Col·loquem protectors oculars, protector dental i dues vies gruixudes. Analgèsia intraoperatòria amb fentanil i/o remifentanil.

En algun cas bolus d'urapidil o esmolol per controlar l'estímul simpàtic del retractor lingual. Corticoides com a antiinflamatori i trasllat dels pacients sedoanalgesats i intubats a Reanimació en el postoperatori immediat.

El pacients van poder ser extubats entre 15h-36h postoperatòries, resultant el temps mig d'estada a Reanimació de 37h.

En cap cas hi va haver necessitat de reintervenció per sagnat ni traqueostomia.

## Discussió i conclusions

La cirurgia transoral minimitza la necessitat de traqueostomia temporal i el risc de sagnat.

Són consideracions importants la col·locació de la màquina d'anestèsia a 180° del cap del pacient, l'edema lingual associat al temps quirúrgic i a la col·locació del retractor lingual i l'adequat control de l'estimulació simpàtica.

El nostre pròxim objectiu és l'extubació precoç d'aquests pacients, sempre individualitzant cada cas.