



Compartint l'Anestesiologia a les Tres Nacions

Una Comarca, un Hospital, tres Idiomes...



Palau d'Esports i Congressos d'Alp, Girona

XIV

Congrés de la Societat Catalana
d'Anestesiologia, Reanimació i
Terapèutica del Dolor

8 i 9 de novembre de 2018

WWW.CONGRESSCARTD.ORG

MANEIG I CONSIDERACIONS ANESTÈSIQUES EN PACIENTS EMBARASSADES AFECTADES DE PATOLOGIA INTRACRANIAL: A PROPÒSIT D'UN CAS

Ian Jahnke, Laura Ramió, Agnès Martí, Enrique Moret, Teresa Fonseca Pinto, Raquel Torrellas,
Guillermo Laguna
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

Introducció: Una tècnica anestèsica neuroaxial (ANA) durant el part i la cesària és beneficiosa tant per la mare com pel fetus. La presència de patologia neurològica i/o neurovascular en pacients embarassades és un fet relativament freqüent i aquestes pacients ja presenten una compliança cranial disminuïda pels canvis fisiològics que pateixen durant l'embaràs. L'objectiu és revisar quins d'aquests casos es poden beneficiar d'una ANA sense noves complicacions neurològiques associades.

Material i mètodes: Revisió bibliogràfica d'estudis sobre pacients embarassades amb patologia neurològica i/o neurovascular i revisió del protocol per a una ANA en pacients amb patologia intracranial al nostre centre, a partir de l'estudi d'un cas clínic.
Descripció del cas: Es presenta el cas d'una dona amb antecedent de cavernoma cerebral intervingut, que va requerir una cesària programada per part prolongat en dos moments diferents de l'evolució de la seva vida: la primera cesària fou 6 anys després de l'exèresi de la lesió ocupant d'espai cerebral i es va realitzar una anestèsia general; en la segona cesària, 10 anys després de la cirurgia cerebral, es va sol·licitar una RMN cerebral en l'estudi preoperatori seguint l'algorisme d'actuació del nostre protocol, i atesa l'absència de signes de hipertensió intracranial, es va realitzar una ANA sense incidències.

Conclusions: Aquest cas resalta la necessitat d'un estudi multidisciplinar dels equips obstètric, anestesiològic, neuroquirúrgic i radiològic de cara a valorar la possibilitat de poder realitzar una anestèsia neuroaxial en pacients gestants amb patologia neurològica i/o neurovascular prèvia.