



Compartint l'Anestesiologia a les Tres Nacions

Una Comarca, un Hospital, tres Idiomes...



HOSPITAL DE CERDANYA / HOSPITAL DE CÉRDAGNE

Palau d'Esports i Congressos d'Alp, Girona

XIV

Congrés de la Societat Catalana
d'Anestesiologia, Reanimació i
Terapèutica del Dolor

8 i 9 de novembre de 2018

WWW.CONGRESSCARTD.ORG

VIA AÈRIA DIFÍCIL EN SITUACIÓ EMERGENT

David Valencia, Cristina Rodriguez, Neus Sargatal, Fina Parramon, Paula Marin, Carmen Hernandez
Hospital Dr Josep Trueta

INTRODUCCIÓ i OBJECTIU. És un repte per l'anestesiòleg garantir la via aèria (VA) en una situació d'emergència en un pacient amb VA difícil. Es presenta el cas d'un pacient amb factors predictius de ventilació i intubació difícil que pateix deteriorament brusc de consciència.

MATERIAL i MÈTODE. Descripció d'un cas clínic i revisió de la literatura.

RESULTATS. Home, 83 anys. Al·lèrgies i antecedents desconeguts. Estranger resident a creuer que presenta precipitació de la seva pròpia alçada. El troben Glasgow (GCS) 5, obès mòrbid, treball respiratori i cicatriu de toracotomia. Després de múltiples intents d'intubació traqueal fallida amb laringoscòpia, col·loquen mascareta laríngia (ML) I-gel nº5. S'evidencia INR > 8 i es trasllada a l'Hospital.

A l'arribada, GCS 5, anisocòria dreta, ventilació mecànica a través de ML, hipertens, taquicàrdic i trauma facial amb edema cervical i de llengua. Avisen a Anestesiologia per valorar intubació. A través d'I-gel s'introdueix fibrobroncoscopi AMBU. Es visualitzen estructures de VA edematoses i sagnat laringi de baix dèbit. S'aconsegueix visualitzar carina i s'introdueix tub endotraqueal nº7. Per retirar amb seguretat la ML, s'utilitza tub rígid estabilitzador de la ML Fastrach.

Malauradament, el pronòstic per neuroimatge és infaust pel que s'instauen mesures de confort.

CONCLUSIONS. Tot i no poder intubar inicialment, amb la col·locació de ML es va poder ventilar al pacient i planificar l'estratègia de intubació mitjançant dispositius de nova generació i personal entrenat.

La ML tipus Fastrach possibilita la intubació orotraqueal. També es pot intubar a través d'altres ML, tal i com descriu el cas anterior.