

# XV

CONGRÉS DE LA  
SOCIETAT CATALANAD'ANESTESIOLOGIA,  
REANIMACIÓ I TERAPÈUTICA DEL DOLOR

XXI Jornada d'Anestesiologia en Infermeria

4 i 5 DE NOVEMBRE DE 2021

Congrés online



Medicina perioperatòria,  
futur de l'anestesiologia



## SÍNDROME DE HELLP COMPLICAT AMB RUPTURA HEPÀTICA

Ariadna Subirà González; Mireia Raynard Ortiz; Marling Celis Petit; Marta Homs Riera;  
Alejandra Farreras Margenat; Guillermo Cáncer Requeno  
Hospital Universitari Dexeus, servei d'anestesiologia

**Introducció:** La ruptura hepàtica espontània durant el treball de part és una complicació amb una incidència 1/45.000-1/250.000 gestacions i amb una alta mortalitat materna i fetal.

**Cas clínic:** Gestant de 36+5 setmanes amb antecedents d'obesitat i hipertensió límit que ingressa per crisi hipertensiva. S'objectiva perfil hepàtic alterat, plaquetopènia i tensions elevades malgrat tractament. Enfront síndrome de HELLP, CIR II i fetus poc reactiu es decideix finalitzar la gestació mitjançant una cesària. Es realitza anestèsia regional i s'inicia la cirurgia però al obrir l'abdomen s'objectiva hemoperitoneu, s'explora i es troba un hematoma capsular hepàtic i el lòbul dret lacerat. Es reconverteix en anestèsia general i s'activa el codi d'hemorràgia hospitalari. Un cop extret el fetus es procedeix a la cirurgia hepàtica que és complexa però es desenvolupa amb èxit. S'aconsegueix establir a la pacient i es trasllada a unitat de cures intensives on el postoperatori transcórrer sense complicacions.

**Discussió:** La ruptura hepàtica durant l'embaràs és una complicació associada la majoria de vegades al síndrome de HELLP encara que l'absència d'aquest no l'exclou. És conseqüència de dipòsits hepàtics de fibrina que causen obstrucció del flux hepàtic, congestió, necrosis i hematomes. El més freqüent és que es formi un hematoma focal a la cara diafragmàtica del lòbul hepàtic dret. El tractament inclou la finalització de la gestació, tractament del sagnat i estabilització hemodinàmica de la pacient.

**Conclusions:** És imprescindible un alt índex de sospita i un abordatge multidisciplinari per tal d'actuar amb rapidesa i efectivitat enfront aquesta excepcional però greu complicació.