

XV

CONGRÉS DE LA
SOCIETAT CATALANAD'ANESTESIOLOGIA,
REANIMACIÓ I TERAPÈUTICA DEL DOLOR

XXI Jornada d'Anestesiologia en Infermeria

4 i 5 DE NOVEMBRE DE 2021

Congrés online



Medicina perioperatòria,
futur de l'anestesiologia



ORGANITZA



RETINOPATIA TIPUS PURTSCHER EN EL POSTPART. A PROPÒSIT D'UN CAS

Xavier Fontarnau Planas, Xavier Fontarnau; Carla Farré; Javier Cañas; Laura Baumgartner;
David Soto; Pere Esquiús; Meritxell Clarà
Althaia, Xarxa assistencial universitària de Manresa

OBJECTIU: Conèixer les causes i peculiaritats de la retinopatia de Purtscher, a propòsit d'un cas.

MATERIAL I MÈTODES: Es presenta el cas d'una gestant amb pancreatitis aguda que en el postoperatori inicia amb alteracions visuals.

RESULTATS: Analitzem el cas d'una gestant de 36 setmanes, fumadora de tabac i cànnabis. Consulta per dolor abdominal i vòmits d'un mes d'evolució. A l'exploració està obnubilada i presenta registre fetal compatible amb hipòxia crònica, indicant-se cesària urgent. Al postoperatori, s'evidencia anúria, filtrat glomerular de 14ml/min i lipases de 1836U/L, pel que s'orienta com a insuficiència renal aguda per vòmits i pancreatitis aguda. Es realitza reposició de volèmia i ions, millorant la funció renal. A les 24 hores inicia quadre de visió borrosa, valorat per Oftalmologia que evidencia pal·lidesa macular bilateral, hemorràgies superficials i exsudats. Davant la sospita d'hipertensió intracranial es deriva a H. Vall d'Hebron. En l'evolució oftalmològica s'orientà com a neuritis òptica isquèmica bilateral postpancreatitis (Retinopatia tipus Purtscher). En controls posteriors recuperà parcialment l'agudeses visual.

CONCLUSIONS: La retinopatia de Purtscher es una entitat poc freqüent i greu que produeix fenòmens isquèmics en el pol posterior de la retina per microèmbols grassos en arterioles i capil·lars retinals. Aquesta patologia no s'ha de descuidar en processos sistèmics/contextos clínics complexos. Sol donar-se en pacients amb pancreatitis aguda o cirurgia traumatològica, però també pot estar associada a situacions fisiològiques especials com el part. Cal un diagnòstic precoç i un seguiment minuciós dels casos davant la possible irreversibilitat del quadre.