

XV

CONGRÉS DE LA
SOCIETAT CATALANAD'ANESTESIOLOGIA,
REANIMACIÓ I TERAPÈUTICA DEL DOLOR
XXI Jornada d'Anestesiologia en Infermeria

4 i 5 DE NOVEMBRE DE 2021
Congrés online



Medicina perioperatòria,
futur de l'anestesiologia



MANEIG DE L'HEMORRÀGIA HIPOFISÀRIA EN EL POSTOPERATORI DE CESÀRIA URGENT AMB XOC HEMORRÀGIC PER ATONIA UTERINA

Eugenia Pujol, Berta Baca, Paula Marin, Neus Sargatal, Guillem Pla, Carmen Hernández
Hospital Universitari de Girona Josep Trueta

Objectius: Es presenta el cas d'una pacient amb hemorràgia hipofisiària durant el postoperatori de cesària urgent amb xoc hemorràgic secundari a atonia uterina.

Materials i mètodes: Gestant de 37+1 setmanes, sense antecedents mèdics ni complicacions durant la gestació. Ingressa al nostre centre per inducció al part per ruptura prematura de membranes (RPM) amb indicació de cesària posterior, per alteració en el registre cardiotocogràfic. A quiròfan s'observa una hemorràgia aguda secundària a atonia uterina que requereix politransfusió, uterotònics i embolització no sense aconseguir un control del sagnat. Finalment, es sotmet a una histerectomia. Durant l'ingrés a la Unitat de Reanimació, presenta un quadre de cefalea, polidípsia i poliúria. Es va realitzar una tomografia computada (TC) que mostrava una hemorràgia hipofisiària. Es va iniciar corticoteràpia i desmopresina amb resolució posterior de la clínica. Es va donar d'alta a la planta sense focalitat neurològica.

Resultats: La hipertrofia de la hipòfisi durant l'embaràs, fa que aquesta sigui més vulnerable a la hipoperfusió en context hipovolèmia o vasespasmè. La instauració de la isquèmia o necrosi de la hipòfisi amb clínica d'hipopituitarisme, es coneix com la Síndrome de Sheehan. Actualment és una entitat poc freqüent degut a la milloria en el maneig de la hemorràgia obstètrica.

Conclusions: La pacient del cas presenta una hemorràgia de la hipòfisi amb diabetis insípida transitòria pel que es va descartar l'aparició de la síndrome de Sheehan. Tanmateix, serà necessari un control evolutiu posterior ja que podria fer-se evident durant els mesos, i fins i tot, els anys posteriors a l'hemorràgia.