



CASE REPORT: LA MORFINA INTRATECAL PER AL MANEIG DEL DOLOR POSTOPERATORI EN CISTECTOMIA RADICAL ASSISTIDA PER ROBOT

Ewan James Robertson; Ibeth Estefanía Rivera Moreno; Jusset Teresa García-Navia

Hospital Universitari Vall d'Hebron

Introducció: La cistectomia radical és un dels procediments amb més dolor postoperatori de la urologia. L'analgèsia epidural toràcica és desde fa anys la tècnica referent en protocols enhanced recovery after surgery (ERAS) tot i l'existència d'altres alternatives. S'exposa un cas exitós de maneig anestèsic amb morfina en dosi única per al control del dolor postoperatori en cistectomia radical assistit per robot.

Objectius: Reportar un cas clínic sobre l'eficàcia de la morfina intratecal postoperatoria i revisar l'evidència científica disponible.

Mètodes: Cerca bibliogràfica a partir de bases de dades Pubmed, Cochrane Library i Mendeley. Selecció dels articles rellevants.

Resultats: Presentem el cas clínic d'un home de 51 anys amb una neoplasia de bufeta in situ recidivant que s'intervé de forma electiva de cistectomia radical amb neobufeta ileal assistit per Da Vinci. S'administra previ a anestesia general 200mcg (2ml) de Morfina intratecal amb 5mg (1ml) de Bupivacaína 0,5%. Durant la cirurgia el pacient es manté estable amb una analgèsia adequada, presentant requeriments mínims d'opioides sistèmics (150mcg). En el postoperatori presenta bon control analgèsic (EVA <2) sense precisar rescats d'opioides ni presentar reaccions adverses greus.

Conclusions: La morfina intratecal amb una sola dosi és una alternativa senzilla, segura i efectiva per al control del dolor postoperatori en cirurgia major, troballes que coincideixen amb el nostre case report. No obstant la bibliografia disponible del seu ús específic en cistectomia radical és escàs per lo que recomanem més estudis de caràcter prospectiu per a considerar establir-la com a tècnica de referència per sobre del catèter peridural.