



## EMBÓLIA DE LÍQUID AMNÒTIC. CAS CLÍNIC I REVISIÓ

Hadit Inirida Contreras Villamil; Carla Farré Tebar; María Laura Baumgartner Lucero; Xavier Fontarnau Planas; Mauricio David Soto Guanotasig; Antonio José Navarro González.

*Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa.*

### EMBÓLIA DE LÍQUID AMNÒTIC. CAS CLÍNIC I REVISIÓ.

Hadit Contreras<sup>1</sup>, Carla Farré<sup>2</sup>, María Baumgartner<sup>2</sup>, Xavier Fontarnau<sup>1</sup>, Mauricio Soto<sup>1</sup>, Antonio Navarro<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Resident del Servei d'Anestesiologia, Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa.

<sup>2</sup>Anestesiòleg. Departament d'Anestesiologia, Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa.

#### Abstract

L'embòlia de líquid amniòtic és una emergència obstètrica que es pot produir durant el part o el postpart immediat, de baixa incidència i alta mortalitat. La patogènesi d'aquesta entitat no és clara. És caracteritzada per un col·lapse cardiovascular agut i una coagulopatia profunda. Presentem el cas d'una pacient de 28 anys, tercípara, amb embaràs de 38 setmanes, que ingressa en fase activa de treball de part. Minuts després de l'amniorrexi artificial inicia quadre de cefalea i dispnea sobtada amb desaturació, disminució del nivell de consciència i convulsions, per la qual cosa es realitza cesària emergent, sota anestèsia general. Intraoperatòriament es realitzen maniobres de reanimació cardiopulmonar a l'objectivar-se activitat elèctrica sense pols, així com també transfusió per atonia uterina i clínica de coagulació intravascular disseminada. Davant la sospita d'embòlia de líquid amniòtic és traslladada intubada a la unitat de cures intensives. Posteriorment es realitza traqueostomia. L'evolució final va ser desfavorable, amb encefalopatia hipòxica isquèmica.

L'embolisme de líquid amniòtic és una condició potencialment mortal. El diagnòstic continua sent principalment clínic, per exclusió d'altres causes. No hi ha una teràpia específica, el tractament és totalment de suport i requereix el ràpid reconeixement per l'equip multidisciplinari i un maneig agressiu a la reanimació per millorar el pronòstic.